

COPIE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Epreuve

Série	Baccalauréat général
Session	2022
Epreuve	EDS - Physique-chimie
Sujet	22-PYCJ1ME1

Candidat

Nom de famille (naissance, usage)	VASIC
Prénom(s)	Ivann Jean
N° Candidat	02045422061
N° d'inscription	002
Né(e) le	08/02/2005

Copie

Nombre de page(s)	14
-------------------	----

Notation

Note	18 / 20
------	---------

Appréciation

Très bon travail.

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) : VASIC

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) : IVANN

N° candidat : 02045422061

N° d'inscription : 002

(Les numéros figurent sur la convocation.)



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le : 08/02/2005

1.1

Concours / Examen : Baccalauréat

Section / Spécialité / Série : box générale

Epreuve : Épreuve de spécialité box générale

Matière : physique chimie

CONSIGNES

- Remplir soigneusement en majuscules le cadre d'identification sur toutes les copies.
- En dehors de ce cadre d'identification, aucun signe distinctif ne doit permettre d'identifier le candidat.
- Ne joindre aucun brouillon et n'effectuer aucun collage et aucun agrapage.
- Ecrire à l'encre foncée et éviter d'utiliser du blanc correcteur. Ne pas composer dans la marge.
- Numéroté chaque page et préciser le nombre total de pages.

Session : 2022

Exercice 1 :

1) Q1. groupe A : alcool
groupe B : cétone
groupe C : acide carboxylique

Q.2. Le pKa des couples acides-base associés à l'erythrosine est de 2, 4 ou 3,8. Dans tous les cas, il est donc inférieur au pH du révélateur de plaque dentaire étudié, qui est de 7. Lorsque le pH est supérieur au pKa, c'est la forme basique qui prédomine, c'est à dire la forme capable de gagner un H^+ . **Ery2-**

Q.3/ D'après le spectre d'absorption de la solution aqueuse du colorant E127, on s'aperçoit que le pic d'absorption se situe à environ 530 nm. D'après le cercle chromatique, on s'aperçoit qu'à une telle longueur d'onde, la couleur absorbée est le vert, et la couleur du colorant E127 sera celle qui est opposée au vert, c'est à dire le rouge. Le colorant E127 va ensuite donner sa couleur au révélateur de plaque dentaire, ce qui explique sa couleur rouge.

Q4) D'après la figure 1, en traçant la droite correspondant à l'évolution de l'absorbance, on s'aperçoit que pour la solution S qui a une absorbance de 0,484, la concentration en quantité de matière du colorant E127 apportée est d'environ $5,5 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. La solution S contient 0,5 mL de révélateur de plaque dentaire dans une fiole jaugée de 2,0 L, ce qui signifie qu'on a réalisé une dilution de $\frac{2}{0,5 \times 10^{-3}} = 4000$. Ce qui signifie que le révélateur de plaque dentaire a une concentration de colorant E127 apportée $= 4000 \times 5,5 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0,022 = 2,2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. La formule permettant de trouver le titre massique est : $t = \frac{m_{\text{soluté}}}{m_{\text{solution}}}$. La ~~masse~~^{quantité} du soluté (E127) est de $m = C \times V = 2,2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,5 \times 10^{-3} = 1,1 \times 10^{-5} \text{ mol}$. La masse de la solution du révélateur de plaque dentaire est de $m = \rho \times V = 1 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} \times 0,5 \text{ mL} = 0,5 \text{ g}$. La masse du soluté (E127) est de $m = n \times M = 1,1 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 880 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,00968 \text{ g} = 9,68 \times 10^{-3} \text{ g}$. On a donc un titre massique $= \frac{m_{\text{soluté}}}{m_{\text{solution}}} = \frac{9,68 \times 10^{-3}}{0,5} \approx 0,019$. Soit un titre massique d'environ 20%. Ce qui est environ équivalent à ce qui est indiqué sur le site du fabricant.

Très bien

2) Q. 5/ étape 1 = le rôle de cette étape est de produire la forme $H_2 Ery$ de l'érythrosine.
 étape 2 = le rôle de cette étape est la filtration, qui permet de récupérer le solide $H_2 Ery$ indépendamment des autres espèces.

étape 3 = le rôle de cette étape est d'obtenir la température de fusion du solide, afin de savoir à quel température il sera possible de le transformer en liquide.

Q. 6/ Dans l'étape 1, le fait de chauffer le mélange permet d'optimiser la vitesse de formation de l'érythrosine. Car la température est un facteur cinétique et plus la température du mélange est élevée, plus la réaction sera rapide.

Q. 7/ Tableau d'avancement de la réaction
 (qté en mol)

	$H_2 Flu$	$+ 4 I_2$	$\rightarrow$	$H_2 Ery$	$+ 4 HI$
x_i	0,015	0,037		0	0
x_f	$0,015 - x_f$	$0,037 - 4x_f$		x_f	$4x_f$
x_{max}	$0,015 - x_{max}$	$0,037 - 4x_{max}$		x_{max}	$4x_{max}$

$$m_{H_2 Flu \text{ initial}} = \frac{m}{M} = \frac{5}{332} \approx 0,015 \text{ mol}$$

$$m_{I_2} = \frac{m}{M} = \frac{9,5}{254} \approx 0,037 \text{ mol}$$

Si $H_2 Flu$ est le réactif limitant,
 $x_f^{max} = 0,015$

Si $4I_2$ est le réactif limitant,
 $x_{max} = \frac{0,037}{4} = 0,009$

$$0,009 < 0,015$$

donc I_2 est le réactif limitant

Q8/ la quantité d'érythroisine de forme $H_2 Ery$ obtenue est égale à $x_f = 590/10$ de x_{max} car le rendement est de 590/10

$$x_{max} \approx 0,009 \text{ mol}$$

$$x_f = 0,59 \times 0,009 \approx 0,00535$$

la masse d'érythroisine obtenue est alors

$$m = n \times M = 0,00535 \text{ mol} \times 836 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\approx 4,4734 \text{ g}$$

$$\approx 4,6 \text{ g}$$

Q.9/

$C = \frac{n}{V} \rightarrow$ Volume de révélateur de plaque dentaire qu'il est possible de fabriquer $= V = \frac{n}{C}$

$$\rightarrow V = \frac{m}{CM} = \frac{4,6 \text{ g}}{2,2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 836 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$\approx 0,25 \text{ L}$$

$$\approx 250 \text{ mL}$$

La valeur est légèrement supérieur à 250 mL, on peut donc fabriquer $\frac{250}{10} = 25$ flacons

de 10 mL de révélateur de plaque dentaire, de pH égale à 7 et de concentration égale à $2,2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en colorant E127.

3) Q.10/ Pour l'expérience A, au cours du temps, la vitesse volumique de disparition de la forme Ery^{2-} va diminuer. La vitesse volumique de disparition d'un réactif est la dérivée de l'évolution de la concentration de ce réactif. Pour prouver cette évolution, on peut calculer cette vitesse volumique de disparition en regardant le coefficient directeur de la tangente à un point au début de la courbe, et le comparer avec

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

N A S I C

Prénom(s) :

J V A N N

N° candidat :

0 2 0 4 5 4 2 2 0 6 1

N° d'inscription :

0 0 2

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :

0 8 / 0 2 / 2 0 0 5

1.1

Concours / Examen : Section / Spécialité / Série :

Epreuve : Matière :

CONSIGNES

- Remplir soigneusement en majuscules le cadre d'identification sur toutes les copies.
- En dehors de ce cadre d'identification, aucun signe distinctif ne doit permettre d'identifier le candidat.
- Ne joindre aucun brouillon et n'effectuer aucun collage et aucun agrapage.
- Ecrire à l'encre foncée et éviter d'utiliser du blanc correcteur. Ne pas composer dans la marge.
- Numéroté chaque page et préciser le nombre total de pages.

Session :

Le coefficient directeur de la tangente à un point à la fin de la courbe. On s'aperçoit que plus on avance avec le temps, plus les tangentes au point de la courbe ont un coefficient directeur (à sa valeur absolue) faible, ce qui montre que la vitesse volumique de disparition diminue au cours du temps. Le facteur cinétique à l'origine de cette évolution est la concentration des réactifs, car plus cette dernière est élevée, plus la réaction est rapide.

Bien

Q.11/ Le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la concentration du réactif a atteint la moitié de sa valeur initiale. Avec une concentration initiale de $8,5 \text{ } \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la concentration du réactif a une valeur de $4,25 \text{ } \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Graphiquement on trouve $t_{1/2} = 150 \text{ s}$. Le temps de demi-réaction est faible par rapport au temps total de la réaction (800 s). $\frac{150}{800} = 0,1875$

Lorsqu'on atteint le temps de demi-réaction, on est seulement à 18,75 % de la fin de

Page / nombre total de pages

0 5 / 1 2

la réaction.

Q. 12/ Pour optimiser cette décoloration et la rendre plus rapide, on peut augmenter la concentration des réactifs, utiliser un catalyseur (qui permet d'accélérer la réaction sans intervenir dans son bilan); ou bien augmenter la température, à l'aide d'un chauffage à reflux, qui rend la réaction plus rapide et qui permet d'avoir très peu de pertes.

Exercice A :

Q. 1/ La phase 1 correspond au moment entre le ~~lancer~~ premier lancer de la balle et le premier rattrapage de la balle. Lors de cette phase, la balle effectue un mouvement parabolique, et sa position y en m augmente jusqu'à atteindre le sommet de la parabole, pour ensuite diminuer jusqu'à revenir à 0 m. La vitesse V_y quand elle est positive jusqu'au moment où la balle atteint le sommet, et elle devient ensuite négative. La vitesse V_y est strictement décroissante sur la phase 1.

Q. 2/ Lors de la phase 2, la main tient la balle et la fait descendre en dessous de sa position y initiale, avant de la faire remonter pour la lancer une

~~une~~ nouvelle fois.

Q.3/ Dans le cadre du modèle de la chute libre, les frottements sont négligés. Dans un référentiel Galiléen et avec une balle comme système, la 2^{ème} loi de Newton nous dit que la somme des forces reçues par la balle est égale à la masse de la balle multipliée au vecteur accélération.

~~La seule~~ La seule force agissant sur le système est le poids $\vec{P}$, on a donc :

$$\sum \vec{F} = m \vec{a} = \vec{P} = m \vec{g}$$

$$\rightarrow m \vec{a} = m \vec{g} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$$

$$\vec{g} \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} \text{ donc } \vec{a} \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$$

Donc $a_x = 0$, ce qui signifie que la composante V_x est une constante.

A $t=0$, $V_x = V_{0x}$, donc la composante V_x de la vitesse est égale à V_{0x} lorsque la balle n'est plus en contact avec la main du joueur.

Q.4/ $E_{m0} = E_{c0} + E_{p0}$. $E_{p0} = 0$ car

$$E_{p0} = m \times g \times y_0 \text{ et } y_0 = 0$$

$$\text{Donc } E_{m0} = E_{c0}$$

$$= \frac{1}{2} \times m \times V_0^2$$

La norme du vecteur vitesse $V_0 = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$

$$\text{Donc } E_{m0} = E_{c0} = \frac{1}{2} \times m \times (V_x^2 + V_y^2)$$

$$\text{Q.5/ } E_m = \text{constante} = \frac{1}{2} \times m \times (V_x^2 + V_y^2)$$

$$= E_p + E_c = m \times g \times y + \frac{1}{2} \times m \times V^2$$

L'altitude maximale est atteinte par la balle est au moment où la vitesse $V_y = 0$.

É est-à-dire au moment où

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times m \times V_{0x}^2$$

On a donc $E_m =$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times m \times (V_{0x}^2 + V_{0y}^2) \\ &= \frac{1}{2} \times m \times V_{0x}^2 + \frac{1}{2} \times m \times V_{0y}^2 = 1 \\ &= m \times g \times y + \frac{1}{2} \times m \times V_{0x}^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{2} \times m \times V_{0y}^2}{m \times g \times y} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{2} \times V_{0y}^2}{g \times y} = 1 \Rightarrow \frac{V_{0y}^2}{2g \times y} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{V_{0y}^2}{2g} = 1 \times y = y = H$$

avec $y = H$.

$$Q.6/ H = \frac{V_{0y}^2}{2g} = \frac{(\cancel{3.6}^4)^2}{2 \times 9.81} = 0.81 \text{ m}$$

É est cohérent avec le résultat obtenu par lecture graphique de la figure 2a.

Q.7/ On a $a_y(t) = -g$

On intègre pour trouver $V_y(t)$.

$$V_y(t) = -g \times t + C$$

$$\text{À } t=0, V_{0y} = 4 \Rightarrow C = 4$$

$$\text{Donc } V_y(t) = -g \times t + 4$$

$$Q.8/ \text{ On a } V_{0y} = -g \times t + 4$$

$$-g = \frac{V_{0y} - 4}{t}$$

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :
(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

N A S I C

Prénom(s) :

I V A N N

N° candidat :

0 2 0 4 5 4 2 2 0 6 1

N° d'inscription :

0 0 2

(Les numéros figurent sur la convocation.)



Né(e) le :

0 8 / 0 2 / 2 0 0 5

1.1

Concours / Examen : Section / Spécialité / Série :

Epreuve : Matière :

CONSIGNES

- Remplir soigneusement en majuscules le cadre d'identification sur toutes les copies.
- En dehors de ce cadre d'identification, aucun signe distinctif ne doit permettre d'identifier le candidat.
- Ne joindre aucun brouillon et n'effectuer aucun collage et aucun agrapage.
- Ecrire à l'encre foncée et éviter d'utiliser du blanc correcteur. Ne pas composer dans la marge.
- Numéroté chaque page et préciser le nombre total de pages.

Session :

$$g = -\frac{V_0 y}{t} + 4 \approx 9,8 \text{ est cohérent}$$

Q. 9/6 on a $V_y(t) = -gt + 4$

En intégrant, on trouve :

$$y(t) = -\frac{g}{2}t^2 + 4t + C'$$

Or, à $t=0$, $y(t)=0$

$$\text{Donc } y(t) = -\frac{g}{2}t^2 + 4t$$

Q. 10/

Page / nombre total de pages

0 9 / 1 2

Q. 11 / $t_{\text{air}} = \sqrt{\frac{8 \times 0,81}{9,81}} = 0,81$

La balle reste en l'air pendant 0,81 s lors de la phase 1. C'est plutôt cohérent avec la figure 2)a).

Exercice C :

Q1 / Dans la figure 1, on voit que pour réaliser la charge du condensateur (le circuit contenant un générateur), l'interrupteur est basculé vers la gauche.

$$\begin{aligned}
 \text{Q2 / } E &= U_r + U_c \\
 &= R \times I + U_c \\
 &= R \times \frac{dq}{dt} + U_c \\
 &= R \times \frac{d(U_c \times C)}{dt} + U_c \\
 &= R \times C \times \frac{d(U_c)}{dt} + U_c(t)
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R \cdot C \cdot \frac{dU_c(t)}{dt} + U_c(t) = E$$

Q. 3 / La solution proposée est

$$U_c(t) = E \times (1 - e^{-\frac{t}{\tau_{\text{charge}}}})$$

La constante τ_{charge} est en seconde, est égale à $R \times C$.

La dérivée de $E \times (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$
 $= E \times (1 - \frac{1}{RC} \times e^{-\frac{t}{RC}})$

Donc $RC \times \frac{dU_C(t)}{dt} + U_C(t) = E$

$RC \times E \times (1 - \frac{1}{RC} \times e^{-\frac{t}{RC}}) + E \times (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$


$= E + -\frac{1}{RC} \times RC \times E \times (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) + E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

$= E - 1 \times E \times (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) + E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

$= E$

Il s'agit bien de la solution de l'équation différentielle.

Q.4/



$U_C \text{ à } t=0 = 0 \quad U_C \text{ à } t=+\infty = E$ ✓

Q.5/ $\tau_{\text{charge}} = RC$

$U_C(t) = E \times (1 - e^{-\frac{t}{\tau_{\text{charge}}}})$

Avec $t = 5 \times \tau_{\text{charge}}$, on a

$U_C(t) = E \times (1 - e^{-\frac{5 \times \tau_{\text{charge}}}{\tau_{\text{charge}}}})$
 $= E \times (1 - e^{-5})$

$\approx E \times 0,993$

Ainsi, à la date $t_1 = 5 \tau_{\text{charge}}$, $U_C(t)$ a atteint environ 99,3% de sa valeur finale.

Q. 6/ Lorsque l'interrupteur a été basculé de la position 1 à la position 2, la décharge du condensateur a commencé et $U_C(t)$ a commencé à descendre. Graphiquement, ici c'est passé à l'instant $t_2 = 0,024 \text{ s}$.

Q. 7/ La tangente en $t=0$ coupe l'asymptote en $t = \tau_{\text{graph}}$. Étant donné que l'asymptote est à 0 V , la tangente en $t=0$ (t_2) va couper l'axe des abscisses en $t = \tau_{\text{graph}}$.
On trouve environ $\tau_{\text{graph}} = 0,044$

Q. 8/ $U_C = \frac{q}{C}$

L'équation différentielle de la décharge
 $= R \times C \times \frac{dU_C(t)}{dt} + U_C(t) = 0$

La solution est =
 $U_C(t) = E \times (1 - e^{-\frac{t}{\tau_{\text{decharge}}}}) - E$

Donc $U_C + E = (1 - e^{-\frac{t}{\tau_{\text{decharge}}}}) \times E$
 $\ln(U_C + E) = \ln(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{\text{decharge}}}}) \times E$
 $= (\ln(1) - \frac{-t}{\tau_{\text{decharge}}}) \times E$

D'après le graphique, $E = 6,1$.

$\ln(2006,1) = (\ln(1) + \frac{t}{0,044}) \times E$

$\ln(2006,1) - \ln(1) \times E = \frac{t}{0,044} \times E$

$\frac{\ln(2006,1) \times 0,044}{E} = t$

$t = \frac{\ln(2006,1) \times 0,044}{6,1}$

$\approx 0,548$ seconde

pour la décharge du condensateur du défibrillateur.

Modèle CCYC : ©DNE

NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

V A S I L

PRENOM :
(en majuscules)

I V A N N

N° candidat :

0 2 0 4 9 4 2 2 0 6 1

N° d'inscription :

0 0 2

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)



Né(e) le :

0 8 / 0 2 / 2 0 0 9

ANNEXE à rendre avec la copie

